Про що треба повідомити лікарю, коли ви прийшли на щеплення:

- чи була раніше в дитини реакція на щеплення;
- чи є ознаки того, що дитина хвора;
- чи має алергію на ліки або їжу;
- чи приймає дитина якісь ліки;
- чи проходила дитина курс хіміотерапії, отримувала стероїди або ліки, що пригнічують імунітет;
- з моменту останнього щеплення минуло менше ніж 4 тижні;
- у дитини були судоми.

Лікар огляне дитину, розповість про можливі реакції, назве симптоми, за яких необхідно звертатися по медичну допомогу, а також повідомить, коли потрібно зробити наступні щеплення.

Після щеплення: ваші дії

Протягом 20–30 хвилин необхідно залишатися неподалік від місця проведення щеплення, щоб медичний працівник міг переконатися, що в дитини немає негайної алергічної реакції на вакцину.

Реакції на вакцину — це нормально

Як і будь-які препарати, вакцини можуть викликати реакції, але, як правило, незначні. Реакція на щеплення — це одна з ознак того, що вакцина діє. Незначне почервоніння та біль у місці ін'єкції, підвищення температури — це нормальна реакція на вакцину. Ці симптоми зазвичай самі минають за кілька діб без наслідків для здоров'я, а от захист від інфекційного захворювання залишається, — і це найголовніше.

Обов'язково зверніться до лікаря, якщо:

- у дитини висока температура, яка важко збивається жарознижувальними препаратами;
- дитина тремтить або здригається так, наче їй холодно;
- дитина млява, дуже зблідла;
- дитина відмовляється від води та їжі, блює;
- дитина виразно занепокоєна, довго плаче;
- у дитини судоми.

Убивчі міфи про вакцинацію

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

Ризик тяжких ускладнень, якщо дитина захворіє на кір, набагато вищий, ніж ризик виникнення серйозних реакцій після вакцинації проти кору.

МІФ

«Не варто вакцинуватися під час сезону грипу»

ПРАВДА

Коли в країні триває спалах кору, вакцинуватися просто необхідно!

Немає жодних причин відкладати щеплення від кору через те, що почався сезон грипу. Вакцинація не «виснажує» та не «перевантажує» імунну систему. Більше того, вакцинуватися проти кору та грипу можна в один день — у різні ділянки тіла. Щеплення значно знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок грипу.

За світовими стандартами, застуди з температурою до 38°C також не є протипоказанням до вакцинації.

МІФ

«Краще перехворіти на кір природним шляхом, ніж зробити щеплення»

ПРАВДА

Якщо ваша дитина перехворіє на кір природним шляхом, у неї сформується імунітет проти цього захворювання. Однак інфекція може викликати дуже серйозні ускладнення, наприклад, пневмонію або ураження мозку (енцефаліт).

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ:
moz.gov.ua/immunization

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я

Як захистити дитину від кору

В Україні спалах кору. 2018 року майже 55 000 людей у різних регіонах України захворіли на кір. Унаслідок хвороби померли 16 людей, серед яких 12 — діти.

Головна причина спалаху — велика кількість людей, нещеплених проти кору. Найбільше хворіють на кір у тих областях, де найбільше невакцинованих дітей.

У січні 2019 померли 6 людей.

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

World Health Organization

ЩЕПЛЕННЯ ВЧАСНИЙ ЗАХИСТ unicef

КІР: смертельно небезпечний і швидкий

Кір — надзвичайно заразний і дуже швидко передається від хворої людини до здорової при кашлі, чханні (повітряно-крапельним шляхом). Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

9 з 10 **нещеплених людей або тих, хто не хворіли на кір, контактуючи з хворим, можуть захворіти.**

Інкубаційний період (тобто період, коли зараження відбулося, але симптоми ще не проявляються) становить від 6 до 21 днів. Далі починається період захворювання з високою температурою, головним болем, нежитем, сухим кашлем, збільшенням лімфовузлів, запаленням слизової оболонки очей (сльозотеча, чутливість до світла), можливий пронос та блювота. На 4–5 день хвороби з'являються червоні плямисті висипання, які починаються зі шкіри голови й обличчя, а згодом поширюються на все тіло. Хвороба може тривати більше ніж місяць.

КІР ВИКЛИКАЄ НЕБЕЗПЕЧНІ УСКЛАДНЕННЯ

Захворювання може призвести до пневмонії, вушної інфекції (середнього отиту), запалення мозку (енцефаліту), а також до інвалідності та смерті.

Гарантовані державою щеплення проти кору — безоплатні

На відміну від вакцинації, хвороба може потребувати госпіталізації та значних витрат на ліки.

Ліків від кору не існує

Специфічного лікування кору немає. Лікують лише симптоми, і в разі виникнення бактеріальних інфекцій призначають антибіотики. Може знадобитися перебування в реанімаційному відділенні. Проте захворюванню можна запобігти. Тобто зробити щеплення, адже

єдиний надійний метод захисту від кору — ВАКЦИНАЦІЯ.

Від кору захищають дві дози вакцини

Вакцинація проти кору формує імунітет, і організм людини стає невразливим до захворювання.

Згідно з Національним календарем щеплень України, першу дозу вакцини від кору вводять у 12 місяців, а другу — в 6 років.

Вакцина проти кору безпечна та ефективна

Щеплення проти кору робиться за допомогою вакцини проти кору, паротиту і краснухи (КПК). В Україні для щеплення КПК застосовують вакцину Пріорикс™/Priorix™ (виробник GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Бельгія) або вакцину «MMR II» (виробник Merck Vaccines, США). Обидві вакцини гарантовані державою безоплатно в рамках національного календаря профілактичних щеплень. Вони безпечні, ефективні та прекваліфіковані ВООЗ, найавторитетнішою організацією світу в сфері охорони здоров'я.

Коли потрібно робити щеплення

- Дитині виповнилося 12 місяців: не зволікайте із плановим щепленням проти кору.
- Якщо дитина старша від 1 року і ви пропустили перше щеплення, — негайно надолужте його, звернувшись до вашого сімейного лікаря або педіатра.
- Дитині 6 років: час робити друге щеплення проти кору.
- Якщо ви пропустили друге щеплення в 6 років, негайно зверніться до вашого сімейного лікаря або педіатра.

  Адже лише дві дози вакцини забезпечують захист.
- Якщо дитині шість та більше років і вона не має жодного щеплення проти кору. Потрібно ввести дві дози вакцини. Між щепленнями повинен минути 1 місяць.
- Якщо ви не пам'ятаєте, чи робили дитині щеплення проти кору, або не маєте документальних підтверджень цього, дитину потрібно вакцинувати.

  Додаткова вакцинація проти кору не шкодить здоров'ю дитини, а навпаки — посилює захист.

Не потрібно готуватися до вакцинації

Вакцинація не вимагає змін звичного способу життя: не потрібно дотримуватися дієти, приймати ліки, наприклад, жарознижувальні чи протиалергійні препарати перед вакцинацією. Не потрібні аналіз крові, сечі, «імунограма».